

BOLETIN INFORMATIVO

AÑO III. N° 3, Marzo 1998

ESTE MES

Siembras tempranas de fabes

El ciclo habitual de cultivo de la faba granja asturiana se extiende desde la siembra, de mediados a finales de mayo, hasta finales de octubre o mediados de noviembre para la recolección. Los meses de octubre y noviembre se caracterizan por lluvias muy frecuentes, propiciando epidemias muy severas de antracnosis que, al manchar la semilla, pueden ocasionar hasta el 50-60% de destrio.



Interesa por tanto adelantar el ciclo del cultivo para culminar el calendario de recolección a finales de septiembre, evitando el periodo más lluvioso. Con este objetivo se efectuaron ensayos en el CIATA con siembras tempranas con acolchado de la línea de siembra.

Las siembras del mes de abril con acolchado de la línea de siembra tuvieron nascencias satisfactorias y centraron el calendario de recolección entre finales de agosto y principios de octubre. La incidencia de grano manchado fue inferior al 10%, mientras que en las siembras convencionales realizadas en el mes de mayo oscilaron entre el 18 y el 27%.

El material de cobertura a utilizar es un plástico transparente y fino (de 100 galgas), que se comercializa en bobinas de 90 cm. de anchura.

El desarrollo de esta técnica aplicada a la realización de siembras tempranas de fabes, incluye las siguientes fases:

Desde principios de abril se pueden realizar las siembras, efectuando todas las labores previas, incluyendo la aplicación de *Pendimentatina* (Stomp LE) para el control de malezas, de forma similar al cultivo habitual.

Las líneas de siembra se tapan con el plástico de referencia, colocado sobre el mismo suelo y enterrándolo por los dos márgenes de la línea de siembra, quedando una zona de cobertura sobre el surco de 30 cm. de anchura. La siembra y colocación del plástico son operaciones mecanizables con un ahorro importante en mano de obra.

A los 10-12 días se inicia la germinación y nascencia, procediendo a perforar el plástico para que las plantas se vayan aclimatando, ya que 2 ó 3 días después, con la mayor parte de las plantas nacidas, se procede a cortar el plástico a lo largo del surco, para que las plantas que den a la intemperie. No conviene demorar esta operación, pues si hace mucho sol las plantas pueden sufrir quemaduras.

Con siembras efectuadas en Villaviciosa en fecha 11 de abril de 1997 se finalizó la recolección al 30 de septiembre con resultados muy favorables.

Esta información se puede ampliar consultando la publicación del CIATA "Serie Técnica" n°1/98.

Colaboración técnica: Miguel Ángel FUEYO OLMO

Sumario

ESTE MES: Siembras tempranas de fabes

TECNICA: Pequeños frutos. La producción de planta (y II)

TECNICA: Sistemas cortos de lactancia (II)

INFORMACIÓN: El servicio VIDEOTEX en el campo asturiano.