

ESTE MES.....

Semilleros de tomate

Conviene ir haciendo los pedidos de semilla y materiales, así como revisar el funcionamiento de la cama caliente (termostato, termómetros, drenaje, etc.) de cara a la preparación, entre finales de Enero y media-dos de Febrero, de los semilleros de tomate para cultivo en invernadero destinado a producción precoz (Junio, Julio, principios de Agosto).

Para asegurar la nascencia hay que preparar el semillero en un sus-trato (turba), teniendo en cuenta que la calidad de la planta dependerá de los siguientes factores:

- Densidad de siembra: 8-10 g. de semilla/m².
- Profundidad: 0,5 cm.
- Temperatura óptima: 22-25°C
- Riego: mantener húmedo el sus-trato.

En estas condiciones, a los 3-5 días se produce la nascencia de las plantas; a partir de entonces se graduará la temperatura (1-2°C diarios) hasta descender a 15-18°C.

Al inicio de la emisión de la primera hoja verdadera se efectuará el repicado, consistente en pasar las plantitas de tomate del semillero a cepellones de turba (o de turba mezclada con perlita o corteza de pino para mejorar la porosidad) con dimensiones 6 X 6 X 6 8 X 8 X 8 c m . , utilizando como asidero los cotiledones y evitando manipulaciones sobre el tallo o la radícula.

Los cepellones se colocarán sobre una lámina de plástico negro en el suelo o sobre unos caballetes.

Será preciso disponer de un túnel invernadero para la obtención de las plantas, tapándolas en noches frías con un doble túnel de EVA o manta térmica.

A partir de la tercera hola conven

drá aumentar el espacio entre plantas e iniciar aportaciones semanales de abono con el riego (fosfato monoamónico o un complejo tipo 12-36-12, a concentraciones de 1-2 g/l) y aplicar un programa fitosanitario preventivo contra enfermedades (empleando materias activas como: Captan, Cobre, Clortalonil, TMTD, u otras) y plagas, especialmente el pulgón (Metomilo, Acefato u otros).

Establecimiento de plantaciones de manzano de sidra

Las plantaciones de manzano de sidra deben efectuarse entre finales de diciembre y principios de marzo.

Una vez preparado el terreno mediante un adecuado aporte de enmiendas, abonos y laboreo del suelo, se procederá a realizar el replanteo de las líneas de plantación, que a ser posible se orientarán en dirección N-S, para aprovechar mejor la luz.

En el sistema de cultivo en eje vertical y portainjerto clonal de vigor medio MM 106 se aconseja para la mayor parte de las variedades una distancia de plantación de 5,5 x 2,5 m., con la variedad De la Riega 5,25 x 2,25 m. y con las variedades Collaos y Teórica 5 x 2 m.

Se pueden plantar 3 ó 4 líneas de la misma variedad, situando próximas las variedades que coincidan en la época de floración. A continuación se presentan algunas variedades agrupa-das por épocas de floración:

Floración intermedia: Coloradona, Clara, R. Encamada y Perezosa.

Floración bastante tardía: Blanquina, De la Riega, Teórica, Ernestina y Verdialona.

Floración tardía-muy tardía : Collaos, Durona de Tresalí, Raxao, Perico, Limón, Montes, Regona y Xuanina.