SITUACIÓN DE LA SELECCIÓN CLONAL DE VID EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SERIDA
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario

EL VIÑEDO EN ASTURIAS. ANTECEDENTES

- Cultivo de viña en predios del Monasterio de San Vicente de Oviedo (781).
- Expansión por los monjes Benedictinos del Monasterio de Corias - Cangas del Narcea (siglo XII).
- 5493 ha en el año 1858; 1878 ha en 1903.
- Fuerte crisis debido a la filoxera, oidio y mildiu a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
- Injerto del viñedo por técnicos franceses y aportación de variedades francesas.

VIÑEDO DE ASTURIAS EN EL SIGLO XVIII



EL VIÑEDO EN ASTURIAS. SITUACIÓN ACTUAL

- **Superficie de 123 ha** debido a dificultad del cultivo, altos costes, emigración a las ciudades y auge en el siglo pasado de la minería. Minifundismo (297 propietarios de 600 parcelas con 66.40 ha plantadas en Cangas del Narcea).

- **Viñedo antiguo**, en su mayoría anterior a 1940. Parcelas situadas en zonas de ladera de pronunciada pendiente, mayor en muchos casos al 60%

SERIDA

SERIDA

SERIDA

MARCO REGLAMENTARIO

- Creación en 1997 de la Asociación de Productores y Elaboradores de Vino de Cangas (APROVICAN)

- Reconocimiento de la denominación *Vino de la Tierra de Cangas* (2001) y posteriormente, de la Indicación Geográfica Protegida *Vino de Calidad de Cangas* (2008).

- Variedades recomendadas: Albarín blanco, Albillo, Garnacha tintorera, Mencía, Picapoll blanco, Verdejo negro.

- Variedades autorizadas: Albarín negro, Carrasquín, Godello, Gewürztraminer, Merlot, Moscatel de grano menudo, Pinot noir, Syrah

AYUNTAMIENTOS INCLUIDOS EN LA DENOMINACIÓN "VINO DE CALIDAD DE CANGAS"

Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz, Tineo.



AÑO	2007	2009	2010	2011
Producción uva (Kg)	65.000	101.268	115.373	120.990

SERIDA

SELECCIÓN CLONAL DE VARIEDADES DE VID

SERIDA

ALBARÍN TINTO

CARRASQUÍN

VERDEJO TINTO

MENCÍA

ALBARÍN BLANCO

GODELLO

MOSCATEL BLANCO

PRESELECCIÓN CLONAL (AÑOS 2003-2006)

	Albarín tinto	Carrasquín	Verdejo tinto	Mencía	Albarín blanco	Moscatel blanco	Godello
EJEMPLARES MARCADOS	88	72	77	69	36	6	22
PLANTAS TESTADAS VIROSIS	43	37	35	35	28	6	21
% PLANTAS VIROSADAS	41.9 %	32.4 %	51.4 %	31.4%	64.3%	0.0%	33.3%

SERIDA

PARCELA DE SELECCIÓN CLONAL

Nº DE CLONES

-VERDEJO TINTO: 8

-ALBARÍN TINTO: 10

-CARRASQUÍN: 10

-MENCÍA: 13

-ALBARÍN BLANCO: 6

-GODELLO: 7

-MOSCATEL BLANCO DE GRANO MENUDO: 3

IDENTIFICACIÓN MEDIANTE 6 LOCI MICROSATÉLITE (GENRES 081)

SERIDA

PARCELA DE SELECCIÓN CLONAL

EVALUACIÓN DE CLONES

-DATOS FENOLÓGICOS

-PRODUCCIÓN DE UVA

-PRODUCCIÓN DE MADERA

-ANÁLISIS DE MOSTO

-ANÁLISIS DE VINO

- CATA

CLON AB 6

SERIDA

PARÁMETROS DE UVA EN VENDIMIA

VARIEDAD CARRASQUÍN

Variedad	Clon	Fecha de vendimia	Grado Brix	pH	Acidez total (g ac. Tartárico/L)	IPT	Producción uva/cepa (Kg)	Peso 100 bayas
CARRASQUÍN	CR-4	10/10/2011	23,3	3,19	11,25	17,3	0,84	153,4
	CR-9		24,6	3,21	10,24	9,3	0,84	175,6
	CR-12		23,6	3,19	10,76	18,5	0,60	147,8
	CR-17		25,1	3,22	10,39	13,2	0,49	169,2
	CR-18		25,2	3,22	9,11	18,8	0,71	162,0
	CR-19		24,2	3,19	10,50	17,8	0,83	177,0
	CR-20		24,3	3,24	10,31	9,3	0,60	134,3
	CR-21		24,6	3,20	10,35	16,9	0,86	156,5
	CR-4	16/10/2012	23,5	3,15	11,65	14,2	1,02	174,1
	CR-9		24,5	3,20	10,48	13,2	0,82	163,6
	CR-12		24,2	3,15	10,20	13,3	0,82	165,6
	CR-17		24,8	3,14	10,25	11,3	0,85	173,8
	CR-18		25,4	3,22	10,35	15,3	0,75	163,0
	CR-19		23,9	3,16	10,78	12,6	0,98	168,9
	CR-20		24,9	3,18	11,19	15,4	0,70	150,0
	CR-21		24,3	3,04	10,51	13,8	1,03	168,6

SERIDA

CLON AT16
SERIDA

PARÁMETROS DE UVA EN VENDIMIA

VARIEDAD ALBARÍN TINTO

Variedad	Clon	Fecha de vendimia	Grado Brix	pH	Acidez total (g ac. tartárico/L)	IPT	Producción uva/cepa (Kg)	Peso 100 bayas
ALBARÍN TINTO	AT-1	13/10/2011	22,0	3,17	9,76	15,9	1,13	170,9
	AT-2		22,6	3,16	10,20	16,5	0,85	158,8
	AT-4		23,1	3,18	9,75	16,5	1,04	162,6
	AT-5		23,4	3,16	9,85	16,1	1,06	168,2
	AT-13		22,0	3,20	10,71	16,4	1,59	173,6
	AT-16		22,3	3,24	10,00	15,9	1,34	157,7
	AT-17		23,2	3,25	9,29	16,6	0,92	177,3
	AT-18		23,9	3,17	11,39	13,5	0,57	153,7
	AT-19		23,0	3,25	10,09	17,1	1,20	161,2
	AT-1	11/10/2012	23,4	3,16	10,23	14,1	0,97	165,4
	AT-2		22,9	3,19	9,68	14,7	1,27	181,7
	AT-4		23,0	3,18	10,14	14,2	1,52	168,7
	AT-5		23,3	3,08	10,81	13,2	1,10	171,4
	AT-12		23,7	3,14	10,28	14,7	1,23	157,1
	AT-13		21,5	3,26	10,71	13,7	1,06	196,5
	AT-16		22,5	3,17	10,31	12,8	1,71	153,8
	AT-17		19,4	3,26	10,57	12,3	2,25	149,2
	AT-18		23,6	3,25	9,98	16,1	0,48	141,5
	AT-19		21,3	3,06	9,85	14,2	1,53	136,9

VIVERO SELECCIONADOR

SERIDA

PLANTAS CABEZA DE CLON Y PLANTAS DE RESERVA PROCEDENTES DE LA PRESELECCIÓN CLONAL

(SERIDA)

CEPAS MADRE DE MATERIAL DE MULTIPLICACIÓN INICIAL

SERIDA

CAMPO DE CEPAS MADRE DE MATERIAL DE MULTIPLICACIÓN BASE

AGRADECIMIENTOS

- Viticultores colaboradores
- Personal y alumnos de la Escuela Taller de Viticultura de la Fundación de las Comarcas Mineras (Fucomi)
- Asociación “Vino de Calidad de Cangas”
- APROVICAN
- Proder Alto Narcea II Muniellos
- Caja Rural
- Gobierno del Principado de Asturias
- INIA
- Laboratorio Agroalimentario de La Rioja

SERIDA

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

SERIDA
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario