



RECOMENDACIONES SOBRE LA FRECUENCIA DE SIEGA DE LA PRADERA DE RAIGRAS INGLÉS-TREBOL BLANCO EN LA ZONA COSTERA DE ASTURIAS.

El aprovechamiento de la pradera sembrada de raigrás-trébol blanco se realiza de forma no planificada realizándose los cortes sin tener en cuenta la influencia que tiene el intervalo entre aprovechamientos sucesivos sobre la cantidad como sobre la calidad del forraje cosechado. A veces se siega cuando la hierba es muy corta, con lo que se frena la capacidad productiva perdiéndose bastantes kilos de forraje. Otras veces se siega cuando la hierba ya está muy pasada con lo cual se resiente la calidad del forraje cosechado.

Resulta por lo tanto de gran interés conocer de forma precisa la influencia que tiene el intervalo entre cortes sobre la producción y la calidad del forraje obtenido. OBSERVACIONES

- A medida que se alarga el intervalo entre cortes desde 2 hasta 6 semanas aumenta la cantidad de forraje cosechado.
- La calidad del forraje tiende a disminuir a medida que aumenta la cantidad del mismo.
- Los cambios en la calidad y en la cantidad del forraje cosechado son más drásticos a final de primavera en que el raigrás espiga.
- Es necesario llegar a un compromiso entre calidad y cantidad de forraje cosechado para maximizar la capacidad de manutención del ganado con base a una superficie forrajera determinada.

RECOMENDACIONES

- No resulta aconsejable cortar la pradera antes de que haya podido recuperarse al menos durante tres semanas, ya que aunque la calidad del forraje es alta, la cantidad cosechada es muy escasa.
- No es aconsejable tampoco dejar que el intervalo entre cortes se alargue por encima de las seis semanas, ya que aunque la cantidad recogida es mayor, la calidad disminuye excesivamente.
- Un intervalo de cortes entre 4 y 6 semanas es el más recomendable para cosechar una hierba de alta calidad sin perder apenas una parte importante de la producción potencial de la pradera.
- El período más corto corresponderá a la época en que espiga el raigrás (Mayo-Junio) ya que entonces es cuando la calidad se deteriora más rápidamente al alargar el intervalo entre cortes. Este se alargará al principio de primavera y al final del otoño en que la pradera crece más lentamente.