

**Tabla 6.-Relación entre digestibilidad *in vivo* de la materia orgánica y solamente los contenidos en proteína bruta y fibra neutro detergente. Efectos significativos de los factores considerados**

Regresión general							
Dovivo =	$83,5 \pm 7,4$	+ F <sub>0</sub>	$+(0,48 \pm 0,17)$	+ F <sub>1</sub> ×	<b>PB</b>	+ F <sub>2</sub> ×	<b>FND</b>
Sign:	****	****	**	***	**	****	n.s.
Efectos fijos significativos sobre los coeficientes de la ecuación de regresión							
	F <sub>0</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>				
Forrajes verdes	0,00	0,00	$-0,39 \pm 0,09$ ****				
Henos	$- 20,6 \pm 9,6$ *	n.s.	n.s.				
Ensilados	n.s.	n.s.	$- 0,46 \pm 0,03$ ****				
Pajas	$- 111,8 \pm 46,6$ *	n.s.	$+ 0,87 \pm 0,51$ †				
Subproductos	$+ 27,1 \pm 10,0$ **	$- 1,39 \pm 0,43$ **	$- 0,59 \pm 0,15$ ****				

R<sup>2</sup> = 0,55; CV = 7,2; rmse = ± 4,81; F = 52,9; n = 628

\*\*\*\*: P ≤ 0,0001; \*\*\*: P ≤ 0,001; \*\*: P ≤ 0,01; \*: P ≤ 0,05; †: P = 0,0910

**Nota:**

La inclusión de FAD y LAD no mejora la regresión.

En ésta, influyó la naturaleza del forraje o subproducto pero no la de la familia botánica.