

**Tabla 12.- La digestibilidad neutro detergente – celulosa como predictora de digestibilidad *in vivo* referida a nivel de mantenimiento. Regresión general y efectos significativos de los factores considerados sobre los coeficientes de la misma**

Regresión general							
<b>Dovivo1 =</b>	$38,7 \pm 3,7$	+ F <sub>0</sub>	+ L <sub>0</sub> (f <sub>0</sub> (F <sub>0</sub> ))	+ [0,53± 0,07	+ F <sub>1</sub>	+ L <sub>1</sub> (f <sub>1</sub> (F <sub>1</sub> ))	× <b>DoNDC</b>
Sign:	****	**	**	****	**	*	****
Efectos fijos significativos sobre la ordenada en el origen de los factores considerados							
				F <sub>0</sub>		L <sub>0</sub> (f <sub>0</sub> (F <sub>0</sub> ))	
Forrajes verdes				0,00			
Ensilados				- 9,3 ± 4,5 *			
Pajas				+ 8,8 ± 5,2 †			
En laboratorio 3		Henos de gramíneas				0,00	
		Henos de mezclas				+ 17,3 ± 7,4 *	
Efectos fijos significativos sobre la pendiente de los factores considerados							
				F <sub>1</sub>		L <sub>1</sub> (f <sub>1</sub> (F <sub>1</sub> ))	
Forrajes verdes				0,00			
Pajas				- 0,35 ± 0,13 **			
En laboratorio 3		Henos de gramíneas				0,00	
		Henos de mezclas				- 0,27 ± 0,15 †	
En laboratorio 4		Ensilados de gramíneas				0,00	
		Ensilados de mezclas				+ 0,11 ± 0,06 †	

R<sup>2</sup> = 0,67; CV = 6,40; rmse = ± 4,27; F = 47,9; n = 753

\*\*\*\* : P ≤ 0,0001; \*\*\* : P ≤ 0,001; \*\* : P ≤ 0,01; \* : P ≤ 0,05; † : P ≤ 0,10

**Nota:**

Resultó preferible la digestibilidad *in vivo* referida a nivel de mantenimiento: hay muchas muestras en que se determinó sobre vacuno lechero a altos niveles de alimentación.

Hay sensible efecto laboratorio, pero puede estar vinculado a la naturaleza de los forrajes que utiliza: cuanto más embastecidos, peor regresión.